

こんなときは

がまんしないで連絡して下さい

《富士宮市立病院の電話番号》

0 5 4 4 - 2 7 - 3 1 5 1 (代表)

下記のような症状はありませんか？

※症状がある場合はがまんしないで、病院に連絡して下さい

- 発熱、感染症・・・ 38℃以上の熱
(発熱時にレボフロキサシン錠を処方されている方は、裏面をご確認ください)
- 下痢・・・・・・・・・・ 激しい下痢、下痢が長く続く、
排便回数(1日4回以上)の増加
- 口内炎・・・・・・・・・・ 広い範囲に痛みがある(食事がとれない)
- 飲み始めて数日以内に下痢と口内炎が同時にあらわれる
- 吐き気、嘔吐・・・・・・・・ 症状が強い、長く続く(食事がとれない)

連絡方法

●昼間について●

午前8時30分～午後5時頃までは、受診科(内科、外科など)まで連絡して下さい。

★夜間および土・日・祝祭日について★

夜間、午後5時頃～午前8時30分まで、および土・日・祝祭日は、救急室の看護師が電話にて対応させていただきます。

*電話の際は、以下の内容をあわてずはっきりとお伝え下さい。

①お名前【.....】

※当院で抗がん剤の治療を受けていることを必ずお伝え下さい。

②診察券番号(7ケタ)【.....】

③主治医【.....科の.....先生です】

④症 状 [いつから]、どのような状態か…！

この用紙は電話の近くなどに貼っておいてください

【内服薬】

- **デカドロン** 3日分 注射の翌日から3日間服用します。
吐き気を抑える作用があります
- **デカドロン** 1日分
浮腫みを予防するために次の注射の前日に服用します。
- **レボフロキサシン** 1日1回 1回1錠 3日間
注射してから7~14日目の時に **38度以上**の熱が出たときに飲むお薬
熱が下がっても、3日間お薬を飲んでください。
飲んでも熱が下がらない場合、病院へ連絡下さい。
飲んでいいか悩んだ場合には、がまんせずに病院へ連絡下さい。

2023.4.3 改定