

ミヤゴステイーニ

# MiYAGOSTINI Vol.9

## 腎機能に注意が必要な薬剤⑨ Triple Whammy

こんにちは！『MiYAGOSTINI（ミヤゴステイーニ）』第9弾です！  
今回のテーマはTriple Whammy（トリプルワミー）です。ACEI/ARB（RASI）  
・利尿薬・NSAIDsの併用で急性腎障害（AKI）が起こりやすくなるのをご存知ですか？  
腎機能を確認する最初の一歩として、MiYAGOSTINIをぜひご活用ください！



バックナンバーこちら

**Triple Whammy** : RASI・利尿薬・NSAIDsの3剤を併用すること  
3剤併用によりAKIのリスク上昇が示唆されている



### 詳細

ACEI/ARB (RASI)+利尿薬+NSAIDsの3剤併用開始後30日以内では、RASI+利尿薬の2剤併用療法に比べてAKIの発症率が1.82倍にも上昇する。

NSAIDsはRASIや利尿薬の処方元とは別の医療機関、診療科(整形外科や皮膚科等)で処方されることも多くみられる。そのためNSAIDsが処方開始となる際は腎機能だけでなく、RASIや利尿薬を服用していないか確認し、服用開始後の腎機能をフォローしていく必要がある。

夏はAKIの発症率が増加するため、これからの時季は脱水に注意が必要です。

國津侑貴他.YAYUGAKU ZASSHI 139,1457-1462(2019)

## 指導時のワンポイント！

### 3剤併用の処方があれば

- ①腎機能低下の有無を確認
- ②夏場の脱水に注意
- ③NSAIDsの変更を検討する

編集後記

先日RASI+利尿剤+NSAIDsの3剤併用している患者さんに遭遇しました。NSAIDsをアセトアミノフェンに変更していただきAKIには至りませんでしたでしたが注意が必要ですね。(富士宮市立病院 A.Y)