

胆道癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
H1	ゲムシタピン+シスプラチン(GC療法)	ゲムシタピン シスプラチン	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 25mg/m ²	DAY1、8 DAY1、8	21日
H2	ゲムシタピン(①⑧)+ S-1(1-14)	ゲムシタピン S-1	ゲムシタピン エスワン	1000mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1、8 DAY1~14	21日
H3	ゲムシタピン単独(①⑧⑯)	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DAY1、8、15	28日
	S-1単独療法	S-1	エスワン	体表面積に応じて	DAY1~28	42日

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン+シスプラチン【GC療法】 2週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day①③
2	シスプラチン	25mg/m ²	DIV	1時間	day①③
3					
1コース期間 休薬の規定		21日		総コース 数	
1日の投与スケジュール 処方例		DAY1、8 注射 1) アロキシ注バッグ(0.75mg) 1袋 デキサート注(6.6mg) 1V 15分でDIV 2) 硫酸マグネシウム 8mL ソルデム3A 500mL 1時間でDIV 3) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分でDIV 4) シスプラチン 25mg/m ² 生食 500mL 1本 1時間でDIV 内服 デカドロン錠4mg 2錠 ファモチジンOD錠10mg 2錠 分2 3日分			

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン【①⑧】+ S-1【1-14】 21日 2週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day 1、8
2	S-1	80mg/m ²	PO		day 1~14
3					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		21日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート注 (6.6mg) 1V 生食 50mL 1本 DIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ			

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン単独【①③⑤】 3週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1、8、15
2					
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート(6.6mg) 1V 生理食塩液 50mL 1本 DIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ			