

胆道癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
H1	ゲムシタビン+シスプラチン《GC療法》	ゲムシタビン シスプラチン	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/㎡ 25mg/㎡	DAY1、8 DAY1、8	21日
H2	ゲムシタビン【①⑧】+ S-1【1-14】	ゲムシタビン S-1	ゲムシタビン エスワン	1000mg/㎡ 体表面積に応じて	DAY1、8 DAY1~14	21日
H3	ゲムシタビン単独【①⑧⑨】	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	DAY1、8、15	28日
H4	ゲムシタビン+シスプラチン+ S-1《GCS療法》	ゲムシタビン シスプラチン S-1	ゲムシタビン シスプラチン エスワン	1000mg/㎡ 25mg/㎡ 体表面積に応じて	DAY1 DAY1 DAY1夕~DAY8朝	14日
H6	イミフィンジ+GC療法	イミフィンジ ゲムシタビン シスプラチン	イミフィンジ ゲムシタビン シスプラチン	1500mg/body 1000mg/㎡ 25mg/㎡	DAY1 DAY1・8 DAY1・8	21日
H7	イミフィンジ維持療法	デュルバルマブ	イミフィンジ	1500mg/body	DAY1	28日
	S-1単独療法	S-1	エスワン	体表面積に応じて	DAY1~28	42日

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン+シスプラチン【GC療法】 2週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day①⑧
2	シスプラチン	25mg/m ²	DIV	1時間	day①⑧
3					
1コース期間 休薬の規定		21日		総コース 数	
1日の投与スケジュール 処方例		DAY1、8 注射 1) パロノセトロン注(0.75mg) 1袋 デキサート注(6.6mg) 1V 15分でDIV 2) 硫酸マグネシウム 8mL ソルデム3A 500mL 1時間でDIV 3) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分でDIV 4) シスプラチン 25mg/m ² 生食 500mL 1本 1時間でDIV 内服 デカドロン錠4mg 2錠 ファモチジンOD錠10mg 2錠 分2 3日分			

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン【①⑧】+S-1【1-14】21日 2週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day 1、8
2	S-1	80mg/m ²	PO		day 1～14
3					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		21日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート注 (6.6mg) 1V 生食 50mL 1本 DIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ			

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン単独【①⑧⑮】 3週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day 1、8、15
2					
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート (6.6mg) 1V 生理食塩液 50mL 1本 DIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ			

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン+シスプラチン+S-1【GCS療法】					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1
2	シスプラチン	25mg/m ²	DIV	1時間	day1
3	S-1	体表面積毎	PO		day1夕～8朝
1コース期間 休薬の規定		14日		総コース 数	
1日の投与スケジュール 処方例		注射 Day1 1) パロノセトロン(0.75mg) 1袋 デキサート注(6.6mg) 1V ホスアプレピタント(150mg) 1V 30分でDIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分でDIV 3) 硫酸マグネシウム 8mL ソルデム3A 500mL 1時間でDIV 4) シスプラチン 25mg/m ² 生食 500mL 1本 1時間でDIV 5) 生食 50mL 1本 DIV 内服 Day1夕～8朝 エスワン 体表面積に応じて 7日間 内服 Day2～4 デカドロン錠4mg 2錠 ファモチジンOD錠10mg 2錠 分2 3日分			

レジメン名(略号)

イミフィンジ+ゲムシタピン+シスプラチン

	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1・8
2	シスプラチン	25mg/m ²	DIV	1時間	day1・8
3	イミフィンジ	1500mg/body	DIV	1時間	day1
1コース期間 休薬の規定		21日		総コース 数	8
1日の投与スケジュール 処方例	<p>注 射</p> <p>Day1</p> <p>1) パロノセトロン(0.75mg) 1袋 デキサート注(6.6mg) 1V ホスアプレピタント(150mg) 1V 30分でDIV 2) 生食 50mL 1本 DIV 3) イミフィンジ 1500mg/body 生理食塩液 100mL 1本 60分でDIV 4) 生食 50mL 1本 DIV 5) ゲムシタピン 1000mg/m² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分でDIV 6) 硫酸マグネシウム 8mL ソルテム3A 500mL 1時間でDIV 7) シスプラチン 25mg/m² 生食 500mL 1本 1時間でDIV 8) 生食 50mL 1本 DIV</p> <p>Day8</p> <p>1) パロノセトロン(0.75mg) 1袋 デキサート注(6.6mg) 1V ホスアプレピタント(150mg) 1V 30分でDIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分でDIV 3) 硫酸マグネシウム 8mL ソルテム3A 500mL 1時間でDIV 4) シスプラチン 25mg/m² 生食 500mL 1本 1時間でDIV 5) 生食 50mL 1本 DIV</p> <p>内服 Day2~4 デカドロン錠4mg 2錠 ファモチジンOD錠10mg 2錠 分2 3日分</p>				

レジメン名 (略号)					
イミフィンジ維持療法					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day 1
2					
3					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1) ボラミン注 1A 生理食塩液 50mL 1本 DIV 3) イミフィンジ 1500mg/body 生理食塩液 100mL 1本 60分でDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ			