

膵臓癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
I1	アブラキサン+ゲムシタビン	パクリタキセル(nab-PTX) ゲムシタビン	アブラキサン ゲムシタビン	125mg/m ² 1000mg/m ²	DAY1、8、15 DAY1、8、15	28日
I2	FOLFIRINOX	オキサリプラチン イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(1-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	エルブラット カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
I3	ゲムシタビン(①⑧)+S-1【1-14】21日	ゲムシタビン S-1	ゲムシタビン エスワン	1000mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1、8 DAY1~14	21日
I4	ゲムシタビン単独【①⑧⑯】	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	DAY1、8、15	28日

レジメン名(略号)

アブラキサン+ゲムシタピン 3週投与1週休薬

	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	アブラキサン	125mg/m ²	DIV	30分	day1、8、15
2	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1、8、15
3					
4					
5					
1コース期間		28日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート 6.6mg 1V アロキシバッグ 1本 DIV 2) アブラキサン 125mg/m ² 生理食塩液 適宜 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ 4) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 5) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ (内服) 牛車腎気丸とメチコパール錠を服用する場合があります。			

レジメン名 (略号)					
FOLFIRINOX					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	エルブラット(林ガリアチ)	85mg/m ²	DIV	2時間	day 1
2	カンプト(伊リカ)	180mg/m ²	DIV	90分	day 1
3	レボホリナート	200mg/m ²	DIV	2時間	day 1
4	5-FU	400mg/m ²	DIV	全開	day 1
5	5-FU	2400mg/m ²	DIV	46時間	day 1~3
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		14日間		総コース数	4週毎に評価
1日の投与スケジュール 処方例		1) アロキシ(0.75mg) 1 P デキサート(6.6mg) 1 V ポラミン(5mg) 1 A プロイメンド(150mg) 1 V プスコパン(20mg) 1 A 30分でD I V 2) エルブラット(100mg) 85mg/m ² ※ 2時間でD I V 5%ブドウ糖(250mL) 1本 3) カンプト 180mg/m ² 4) と同時開始 90分 側管 5%ブドウ糖(250mL) 1本 4) レボホリナート 200mg/m ² 2時間でDIV 5%ブドウ糖(250mL) 1本 5) 5-FU 400mg/m ² 全開 側管 5%ブドウ糖(50mL) 1本 フラッシュ 6) 生食 1本 7) 5-FU 2400mg/m ² 46時間 生食 ()mL (インフューザーポンプLV5を使用) 7) 生食シリンジ(20mL) 1本 ポートフラッシュ用			
Day2より		内服 デカドロン 4mg 2錠 ファモチジン 10mg 2錠 分2 3日分			

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン【①⑧】+S-1【1-14】21日 2週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1、8
2	S-1	80mg/m ²	PO		day1~14
3					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		21日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート 6.6mg 1V 生理食塩液 50mL 1本 DIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ 内服 S-1 DAY1~14 (7日休薬)			

レジメン名 (略号)					
ゲムシタピン単独【①③⑤】 3週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1、8、15
2					
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート 6.6mg 1V 生理食塩液 50mL 1本 DIV 2) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ			