

**膵臓癌**

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
I1	<a href="#">アブラキサン+ゲムシタビン</a>	パクリタキセル(nab-PTX) ゲムシタビン	アブラキサン ゲムシタビン	125mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	DAY1、8、15 DAY1、8、15	28日
I2	<a href="#">FOLFIRINOX</a>	オキサリプラチン イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	オキサリプラチン カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
I3	<a href="#">ゲムシタビン【①⑧】+S-1【1-14】21日</a>	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	DAY1、8 DAY1~14	21日
I4	<a href="#">ゲムシタビン単独【①⑧⑮】</a>	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	DAY1、8、15	28日