

脳腫瘍

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
Q1	(初回)テモダール【42日連続】+CRRT	テモゾロミド	テモダール	75mg/m ²	DAY1-42	70日
Q2	(再発)テモダール【5日連続】	テモゾロミド	テモダール	200mg/m ²	DAY1-5	28日

眼科

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
R1	メトトレキサート(硝子体内投与)	メトトレキサート	メトトレキサート	400 μg/Body	週2回を1ヶ月の後 週1回を1ヶ月の後 月1回を8ヶ月	

造血器

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
W1	CHOP療法	シクロfosファミ ドキシソルピシン ピンクリスチン プレドニゾロン	エンドキサン ドキシソルピシン オンコピン プレドニン錠	750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 60mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1-5	21日
W2	CHOP療法+リツキサン【2日間投与】	シクロfosファミ ドキシソルピシン ピンクリスチン プレドニゾロン リツキシマブ	エンドキサン ドキシソルピシン オンコピン プレドニン錠 リツキサン	750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 60mg/m ² 375mg/m ²	DAY2 DAY2 DAY2 DAY1-5 DAY1	21日
W3	CHOP療法+リツキサン【同日投与】	シクロfosファミ ドキシソルピシン ピンクリスチン プレドニゾロン リツキシマブ	エンドキサン ドキシソルピシン オンコピン プレドニン錠 リツキサン	750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 60mg/m ² 375mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1-5 DAY1	21日
W4 W5 W6	CAG療法	シタラビン アクラルピシン フィルグラスチム	キロサイド アクラシノン フィルグラスチム	10mg/m ² × 2 14mg/m ² 2-5 μg/kg	DAY1夕-DAY15朝 芽球の残存により 好中球数により	15日

ANCA関連血管炎

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
Y1	エンドキサンパルス療法	シクロfosファミ	エンドキサン	500mg/m ²	DAY1	28日
Y2	リツキサン寛解導入(1週毎)	リツキシマブ	リツキサン	375mg/m ²		
Y21	リツキサン維持療法(2週毎)					
Y22	リツキサン維持療法(6ヶ月毎)					

原発不明癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
Z1	TC療法	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m ²	DAY1	
Z2		カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5-6mg	DAY1	21日