

**膵臓癌**

レジメン番号	レジメン名	抗瘍剤(一般名)	抗瘍剤(商品名)	用量	用法	1クール
I1	<a href="#">アブラキサン+ゲムシタピン</a>	パクリタキセル(nab-PTX) ゲムシタピン	アブラキサン ゲムシタピン	125mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	DAY1、8、15 DAY1、8、15	28日
I2	<a href="#">FOLFIRINOX</a>	オキサリプラチン イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(1-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	エルブラット カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
I3	<a href="#">ゲムシタピン【(1)X(8)】+S-1【(1-14)】21日</a>	ゲムシタピン S-1	ゲムシタピン エスワン	1000mg/m <sup>2</sup> 体表面積に応じて	DAY1、8 DAY1~14	21日
I4	<a href="#">ゲムシタピン単独【(1)X(8)X(15)】</a>	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	DAY1、8、15	28日