

脳腫瘍

| レジメン番号 | レジメン名 | 抗癌剤(一般名) | 抗癌剤(商品名) | 用量 | 用法 | 1クール |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------------------|---------|------|
| Q1 | (初回)テモダール【42日連続】+CRRT | テモゾロミド | テモダール | 75mg/m ² | DAY1-42 | 70日 |
| Q2 | (再発)テモダール【5日連続】 | テモゾロミド | テモダール | 200mg/m ² | DAY1-5 | 28日 |
| Q3 | アバステン単独 | ペバシズマブ | アバステン | 10mg/kg | DAY1 | 14日 |

眼科

| レジメン番号 | レジメン名 | 抗癌剤(一般名) | 抗癌剤(商品名) | 用量 | 用法 | 1クール |
|--------|-----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|------|
| R1 | メトレキサート(硝子体内投与) | メトレキサート | メトレキサート | 400 μg/Body | 週2回を1ヶ月の後 週1回を1ヶ月の後 月1回を8ヶ月 | |

造血器

| レジメン番号 | レジメン名 | 抗癌剤(一般名) | 抗癌剤(商品名) | 用量 | 用法 | 1クール |
|----------------|---------------------|---|--|--|--|------|
| W1 | CHOP療法 | シクロfosファミ ドキシソルピシン ピンクリスチン ブレドニゾロン | エンドキサン ドキシソルピシン オンコビン ブレドニン錠 | 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 60mg/m ² | DAY1 DAY1 DAY1 DAY1-5 | 21日 |
| W2 | CHOP療法+リツキサン【2日間投与】 | シクロfosファミ ドキシソルピシン ピンクリスチン ブレドニゾロン リツキシマブ | エンドキサン ドキシソルピシン オンコビン ブレドニン錠 リツキサン | 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 60mg/m ² 375mg/m ² | DAY2 DAY2 DAY2 DAY1-5 DAY1 | 21日 |
| W3 | CHOP療法+リツキサン【同日投与】 | シクロfosファミ ドキシソルピシン ピンクリスチン ブレドニゾロン リツキシマブ | エンドキサン ドキシソルピシン オンコビン ブレドニン錠 リツキサン | 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 60mg/m ² 375mg/m ² | DAY1 DAY1 DAY1 DAY1-5 DAY1 | 21日 |
| W4 W5 W6 | CAG療法 | シタラビン アクラルピシン フィルグラスチム | キロサイド アクラシノン フィルグラスチム | 10mg/m ² × 2 14mg/m ² 2-5 μg/kg | DAY1夕-DAY15朝 芽球の残存により 好中球数により | 15日 |

パルス療法(内科)

| レジメン番号 | レジメン名 | 抗癌剤(一般名) | 抗癌剤(商品名) | 用量 | 用法 | 1クール |
|--------|-----------------|-----------|----------|----------------------|------|------|
| Y1 | エンドキサンパルス療法 | シクロfosファミ | エンドキサン | 500mg/m ² | DAY1 | 28日 |
| Y2 | リツキサン寛解導入(1週毎) | リツキシマブ | リツキサン | 375mg/m ² | DAY1 | 7日 |
| Y21 | リツキサン維持療法(2週毎) | リツキシマブ | リツキサン | 500mg/body | DAY1 | 14日 |
| Y22 | リツキサン維持療法(6ヶ月毎) | リツキシマブ | リツキサン | 500mg/body | DAY1 | 180日 |

原発不明癌

| レジメン番号 | レジメン名 | 抗癌剤(一般名) | 抗癌剤(商品名) | 用量 | 用法 | 1クール |
|--------|-------|----------|----------|----------------------|------|------|
| Z1 | TC療法 | パクリタキセル | パクリタキセル | 175mg/m ² | DAY1 | |
| Z2 | | カルボプラチン | カルボプラチン | AUC 5-6mg | DAY1 | 21日 |

神経内分泌癌

| レジメン番号 | レジメン名 | 抗癌剤(一般名) | 抗癌剤(商品名) | 用量 | 用法 | 1クール |
|--------|---------------|------------------|------------------|---|---------------------|------|
| O2 | シスプラチン+ラステット | シスプラチン エトポシド | シスプラチン ラステット | 80mg/m ² 100mg/m ² | DAY1 DAY1-3 | 21日 |
| O3 | シスプラチン+カンプト | シスプラチン イリノテカン | シスプラチン カンプト | 60mg/m ² 60mg/m ² | DAY1 DAY1. 8. 15 | 28日 |
| O4 | カルボプラチン+ラステット | カルボプラチン エトポシド | カルボプラチン ラステット | AUC=5 80mg/m ² | DAY1 DAY1-3 | 21日 |