

食道癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
E55	シスプラチン(d1)+5-FU(d1-5)	シスプラチン(CDDP) フルオロウラシル(5-FU)	シスプラチン 5-FU	80mg/m ² 800mg/m ²	Day1 Day1~5	28日
E6	FP+RT療法(Stage I、IVa)	シスプラチン(CDDP) フルオロウラシル(5-FU)	シスプラチン 5-FU	70mg/m ² 700mg/m ²	Day1 Day1~5	21日
E60	FP+RT療法(Stage II、III)	シスプラチン(CDDP) フルオロウラシル(5-FU)	シスプラチン 5-FU	75mg/m ² 1000mg/m ²	Day1 Day1~5	21日
E61	アクブラ【低用量】+5-FU+CRT	ネダプラチン(CDGP) フルオロウラシル(5-FU)	アクブラ 5-FU	7mg/m ² 350mg/m ²	Day1-5,8-12, 15-19,22-26	42日
E615	オプジーボ単独(2週毎)	ニボルマブ	オプジーボ	240mg/body	Day1	14日
E616	オプジーボ単独(4週毎)	ニボルマブ	オプジーボ	480mg/body	Day1	28日
E64	ドセタキセル【3週毎】	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/m ²	Day1	21日
E65	パクリタキセル【weekly】100mg/m²	パクリタキセル(PTX)	パクリタキセル	100mg/m ²	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	56日
E66	ネダプラチン+5-FU(d1-5)	ネダプラチン(CDGP) フルオロウラシル(5-FU)	アクブラ 5-FU	90mg/m ² 800mg/m ²	DAY1	28日