

肝細胞癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
G1	アイエーコール動注	シスプラチン	アイエーコール	65mg/m ²	DAY1	28日
G2	テセントリク+アバスチン	アテゾリズマブ ベバシズマブ	テセントリク アバスチン	1200mg/b 15mg/kg	DAY1 DAY1	21日

レジメン名 (略号)					
アイエーコール動注 No.0123					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	アイエーコール	65mg/m ²	動注	20分	day 1
2					
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		4~6週間		総コース数	未定

レジメン名 (略号)					
テセントリクキアバスチン					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	テセントリク	1200mg/body	DIV	60分(30分まで短縮可)	day 1
2	アバスチン	15mg/kg	DIV	90分(30分まで短縮可)	day 1
3					
4					
5					
1コース期間(次コースまでの期間) 休薬の規定		21日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		フィルター付きルト使用 1) ポララミン(5mg) 1A 生食(50mL) 1本 フリー 2) 生食(50mL) 1本 フラッシュ 3) テセントリク 1200mg/body 生食 100mL 1本 60分でDIV(30分まで短縮可) 4) アバスチン 15mg/kg 生食(100mL) 1本 90分でDIV(30分まで短縮可) 5) 生食(50mL) 1本 フラッシュ			