

**食道癌**

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
E55	<a href="#">シスプラチン(d1)+5-FU(d1-5)</a>	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	Day1	28日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	Day1~5	
E6	FP+RT療法(Stage I、IVa)	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	700mg/m <sup>2</sup>	Day1~5	
E60	FP+RT療法(Stage II、III)	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1~5	
E61	<a href="#">アクブラ【低用量】+5-FU+CRT</a>	ネダプラチン(CDGP)	アクブラ	7mg/m <sup>2</sup>	Day1-5,8-12,	42日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	350mg/m <sup>2</sup>	15-19,22-26	
E615	<a href="#">オブジーボ単独(2週毎)</a>	ニボルマブ	オブジーボ	240mg/body	Day1	14日
E616	<a href="#">オブジーボ単独(4週毎)</a>	ニボルマブ	オブジーボ	480mg/body	Day1	28日
E64	<a href="#">ドセタキセル【3週毎】</a>	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	Day1	21日
E65	<a href="#">パクリタキセル【weekly】100mg/m<sup>2</sup></a>	パクリタキセル(PTX)	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	56日
E66	<a href="#">ネダプラチン+5-FU(d1-5)</a>	ネダプラチン(CDGP)	アクブラ	90mg/m <sup>2</sup>	DAY1	28日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	800mg/m <sup>2</sup>		

レジメン名 (略号)					
シスプラチン(d1)+5FU(d1-5)					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day 1
2	5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	DIV	21時間	day 1~5
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイド レーション)		DAY1			
		1) ラクテック 500mL	1本	DIV	8:30~9:30
		2) ソルデム3A 500mL	1本		
		硫酸Mg補正液20mEq	8mL	DIV	9:30~10:30
		3) ソルデム3A 500mL	1本	DIV	10:30~11:30
		4) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1袋		
		プロイメンド150mg	1V		
デキサート 6.6mg	2V				
プリンパラン 10mg	1A	DIV	11:30~12:00		
5) マンニトールS	1本	DIV	12:00~12:30		
6) シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>				
生食	250mL	DIV	12:30~13:30		
8) ラクテック 500mL	1本	DIV	13:30~14:30		
9) ソルデム3A 500mL	1本	DIV	14:30~15:30		
7) 5-FU	800mg/m <sup>2</sup>				
生食	500mL	DIV	15:30~12:30		
DAY2~3		DAY2~3			
		1) 生食 50mL	1本	DIV	12:30~13:30
		2) ラクテック 500mL	1本	DIV	13:00~14:00
		3) ソルデム3A 500mL	1本	DIV	14:00~15:00
		4) デキサート 6.6mg	1V		
		プリンパラン10mg	1A		
生食 100mL	1本	DIV	15:00~15:30		
5) 5-FU	800mg/m <sup>2</sup>				
生食	500mL	DIV	15:30~12:30		
DAY4~5		DAY4~5			
		1) 生食 50mL	1本	DIV	フラッシュしてルート交換
		2) 生食 50mL	1本	DIV	フラッシュ用
		3) 5-FU	800mg/m <sup>2</sup>		
生食	500mL	DIV	21時間		
DAY6		DAY6			
		1) 生食 50mL	1本	DIV	フラッシュ

レジメン名 (略号)					
低用量アクリン/5-FU+化学放射線療法(CRT) No.0120					
※浜医よりのレジメン					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	5-FU	350mg/m <sup>2</sup>	DIV	23時間	day1~5、day8~12 day13~19、day22~26
2	アクリン(ネオクリン)	7mg/m <sup>2</sup>	DIV	90分	
3	放射線照射	1.8~2Gy/day			day1~5、day8~12 day13~19、day22~26 day29~33、day36~40
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		6週間 (土日休薬)		総コース数	1コース
1日の投与スケジュール 処方例		DAY1~5 1) デキサート(6.6mg) 1V アロキシ 1本 アロキシはDAY1のみ 2) アクリン(10mg) 1V 7mg/m <sup>2</sup> アクリンはDAY1のみ 生食(500mL) 1V 90分でDIV 3) ラクテック(500mL) 60分でDIV 4) ラクテック((500mL) 60分でDIV 5) 5-FU 1V 350mg/m <sup>2</sup> 23時間でDIV			

レジメン名(略号)					
オブジーボ					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	オブジーボ	240mg/Body	DIV	30分	day 1 (14日毎)
2	または	480mg/Body	DIV	30分	day 1 (28日毎)
3					
4					
5					
1コース期間(次コースまでの期間) 休薬の規定		240mg14日毎または、480mg28日毎	総コース数	PDまで	
1日の投与スケジュール 処方例		フィルター付輸液セットを使用する 1) ポララミン(5mg) 1A 生食(50mL) 1本 10分でDIV 2) 生食(50mL) 1本 フリー 3) オブジーボ 240mg/Body(480mg/Body) 生食(100mL) 1本 1時間でDIV 4) 生食(50mL) 1本 フラッシュ			

レジメン名 (略号)					
ドセタキセル【3週毎】					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間以上	day 1
2					
3					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		21日		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート(6.6mg) 1V 生食(50mL) 1本                    DIV 2) ドセタキセル 70mg/m <sup>2</sup> 生食(250mL) 1本                    2時間でDIV 3) 生食(50mL) 1本                    フラッシュ			

レジメン名(略号)					
パクリタキセル【Weekly】					
※アルコール過敏患者に注意					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パクリタキセル※	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day 1, 8, 15, 22, 29, 36
2					
3					
4					
5					
1コース期間(次コースまでの期間) 休薬の規定		49日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		*フィルター付輸液セットを使用 内服薬 レスタミン錠 5錠 1) デキサート(6.6mg) 1V ファモチジン(20mg) 1本 生食(50mL) 1本 全開でDIV 2) 生食(100mL) 1本 30分でDIV 3) パクリタキセル 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖(250mL) 1本 1時間でDIV 4) 生食(50mL) 1本 フリー			

レジメン名 (略号)					
ネダプラチン+5FU(d1-5)					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	アクブラ	90mg/m <sup>2</sup>	DIV	90分	day 1
2	5-FU	800mg/m <sup>2</sup>	DIV	21時間	day 1~5
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイド レーション)		DAY1			
		1) アロキシ 0.75mg	1袋		
		デキサート 6.6mg	1V	DIV	リ-
		2) アクブラ	90mg/m <sup>2</sup>		
生食	250mL	DIV	90分で		
3) ラクテック 500mL	1本	DIV	60分で		
4) ラクテック 500mL	1本	DIV	60分で		
5) 5-FU	800mg/m <sup>2</sup>				
生食	500mL	DIV	21時間で		
		DAY2~5			
		1) 生食 50mL	1本	DIV	フラッシュしてルート交換
		2) デキサート 6.6mg	1V		
		生食 100mL	1本	DIV	リ-
3) 5-FU	800mg/m <sup>2</sup>				
生食	500mL	DIV	21時間		
		DAY6			
		1) 生食 50mL	1本	DIV	フラッシュ