

頭頸部癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
S1	シスプラチン+放射線	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m ²	DAY1	21日
S2	カルボプラチン+放射線	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 1.5	DAY1, 8, 15, 22	28日
S3	PF療法	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m ²	DAY1	
		フルオロウラシル	5FU	800mg/m ²	DAY1	28日
S4	TPF療法	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m ²	DAY1	
S41	TPF療法(ショート)	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m ²	DAY1	
		フルオロウラシル	5FU	750mg/m ²	DAY1-5	21日
S5	アービタックス+放射線	セツキシマブ	アービタックス	250mg/m ²	DAY1	
S51				初回400mg/m ²		7日
S52	アービタックス(2週毎)+放射線	セツキシマブ	アービタックス	500mg/m ²	DAY1	
						14日
S6	アービタックス+CF療法	シスプラチン	シスプラチン	100mg/m ²	DAY1	
S61		フルオロウラシル	5FU	1000mg/m ²	DAY1	
		セツキシマブ	アービタックス	250mg/m ²	DAY1, 8, 15	
				初回400mg/m ²		21日
S62	アービタックス維持療法(2週間毎)	セツキシマブ	アービタックス	500mg/m ²	DAY1	
						14日
S7	アービタックス+PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²		
S71		セツキシマブ	アービタックス	250mg/m ²	DAY1,8,15,22	
				初回400mg/m ²		28日
S8	オブジーボ単独(2週毎)	ニボルマブ	オブジーボ	240mg/Body	DAY1	
						14日
S81	オブジーボ単独(4週毎)	ニボルマブ	オブジーボ	480mg/Body	DAY1	
						28日
S91	カルボプラチン+パクリタキセル(3週間毎)	カルボプラチン	カルボプラチン	200mg/m ²	DAY1	
		パクリタキセル	パクリタキセル	AUC=6		21日

レジメン名 (略号)					
シスプラチン+放射線					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	シスプラチン	80mg/m ²	DIV	3時間	day8
2					
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		35日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		<p>DAY1</p> <p>1) ラクテック 500mL 1本 DIV 8:30~10:00</p> <p>2) ソルデム3A 500mL 1本</p> <p>硫酸Mg補正液20mEq 8mL DIV 10:00~11:30</p> <p>3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 11:30~13:00</p> <p>4) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg 1袋</p> <p>プロイメンド150mg 1V</p> <p>デキサート 6.6mg 2V</p> <p>プリンペラン 10mg 1A DIV 13:00~13:30</p> <p>5) マンニトールS 1本 DIV 13:30~14:30</p> <p>6) シスプラチン 80mg/m²</p> <p>生食 250mL DIV 14:30~16:30</p> <p>7) ラクテック 500mL 1本 DIV 16:30~18:00</p> <p>8) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 18:00~19:30</p> <p>DAY2,3</p> <p>1) デキサート 6.6mg 1V</p> <p>プリンペラン10mg 1A</p> <p>生食 50mL 1本 DIV 9:30~10:00</p> <p>2) ラクテック 500mL 1本 DIV 10:00~11:30</p> <p>3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 11:30~13:00</p>			
副作用		<p>CDDP: 骨髄抑制 (白血球減少、好中球減少) → G-CSF投与</p> <p>嘔吐、悪心 → 制吐剤</p> <p>腎機能障害 → 減量または中止</p>			

レジメン名 (略号)					
カルボプラチン+放射線					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	カルボプラチン	AUC=1.5	DIV	60分で (照射開始30分前に終了する)	day1、8、15、22
2					
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		DAY1 1) アロキシバ [®] ック 0.75mg 1袋 デキサート 6.6mg 1V ボララミン 5mg 1A DIV フリー 2) カルボプラチン AUC=1.5 生食 250mL 1本 DIV 60分で 3) 生食50mL 1本 DIV ルートフラッシュ用 DAY2~ 内服デカドロン(4mg) 2錠 ファモチジン(10mg) 2錠 分2 3日分			
副作用		好中球減少 … 減量、休薬、必要に応じ、G-CSFの投与 血小板減少 … 減量、休薬、必要に応じ、血小板輸血 悪心・嘔吐 … 制吐剤の投与			

レジメン名 (略号)					
PF療法					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	シスプラチン	80mg/m ²	DIV	1時間	day 1
2	5-FU	800mg/m ²	DIV	24時間	day 1~5
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		DAY1			
		1) ラクテック 500mL 1本 DIV 8:30~10:00 2) ソルデム3A 500mL 1本 硫酸Mg補正液20mEq 8mL DIV 10:00~11:30 3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 11:30~13:00 4) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg 1袋 プロイメンド150mg 1V デキサート 6.6mg 2V プリンペラン 10mg 1A DIV 13:00~13:30 5) マンニトールS 1本 DIV 13:30~14:30 6) シスプラチン 80mg/m ² 生食 250mL DIV 14:30~16:30 7) 5-FU 800mg/m ² 生食 500mL DIV 16:30~16:30 8) ラクテック 500mL 1本 DIV 16:30~18:00 9) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 18:00~19:30			
副作用		DAY2~5			
		1) デキサート 6.6mg 1V プリンペラン10mg 1A 生食 100mL 1本 DIV 9:30~10:00 2) ラクテック 500mL 1本 DIV 10:00~11:30 3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 11:30~13:00			
		骨髄抑制 : 休薬、投与間隔変更 適宜 G-CSF使用			

レジメン名 (略号)					
TPF療法					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	60mg/m ²	DIV	1時間	day 1
2	シスプラチン	70mg/m ²	DIV	2時間	day 1
3	5-FU	750mg/m ²	DIV	24時間	day 1~5
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		21日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		<p>DAY1</p> <p>1) ラクテック 500mL 1本 DIV 8:30~10:00</p> <p>2) ソルデム3A 500mL 1本 硫酸Mg補正液20mEq 8mL DIV 10:00~11:30</p> <p>3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 11:30~13:00</p> <p>4) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg 1袋 プロイメンド150mg 1V デキサート 6.6mg 1V プリンペラン 10mg 1A DIV 13:00~13:30</p> <p>5) ドセタキセル 60mg/m² 生食 250mL DIV 13:30~14:30</p> <p>6) 生食 50mL DIV フラッシュ</p> <p>7) マンニトールS 1本 DIV 14:30~15:30</p> <p>8) シスプラチン 70mg/m² 生食 250mL DIV 15:30~17:30</p> <p>9) 5-FU 750mg/m² 生食 250mL DIV 24時間で</p> <p>10) ラクテック 500mL 1本 DIV 17:30~19:00</p> <p>11) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 19:00~20:30</p> <p>DAY2~5</p> <p>1) デキサート 6.6mg 1V プリンペラン10mg 1A 生食 100mL 1本 DIV</p> <p>2) ラクテック 500mL 1本 DIV 90分で</p> <p>3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 90分で</p> <p>4) 5-FU 750mg/m² 生食 250mL DIV 24時間で</p>			
		骨髄抑 悪心、 腎機能			

レジメン名(略号)					
アービタックス(毎週) + 放射線					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	アービタックス(セキキマブ)	初回 400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	DIV DIV	2時間 1時間	day 1
2					
3					
4	放射線療法				
1コース期間(次コースまでの期間)		7日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) ボララミン(5mg) 1 A デキサート(8.8mg) 1 A 生食(50mL) 1本 DIV 2) アービタックス 250(400)mg/m ² 生食(250mL) 1本 1時間(2時間)でDIV 3) 生食(50mL) 1本 フラッシュ 内服 ミノマイシンCap 100mg 2C 朝夕食後 7日分 皮疹を予防するお薬です 外用 キンダバート 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所(顔) マイザー軟膏 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所(体) ヒルドイドソフト軟膏 25g 1本 皮膚の乾燥したところ			
副作用		* infusion reaction 軽症…投与速度の減速など 重度…投与を直ちに中止し、症状に応じた処置を行なう * 皮膚症状…保湿剤、ステロイド軟膏、ミノマイシンなど 減量・休薬など (上記の減量の及び中止基準投与間隔の変更規定) * 間質性肺炎 * 低マグネシウム血症・電解質異常 * 心毒性 * 下痢 * 眼障害(角膜炎等)			

レジメン名(略号)					
アービタックス(2週毎)+放射線					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	アービタックス(セキキチアブ)	500mg/m ²	DIV	2時間	day 1
2					
3					
4	放射線療法				
1コース期間(次コースまでの期間)		14日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) ポララミン(5mg) 1A デキサート(8.8mg) 1A 生食(50mL) 1本 DIV 2) アービタックス 500mg/m ² 生食(250mL) 1本 1時間(2時間)でDIV 3) 生食(50mL) 1本 フラッシュ 内服 ミノマイシンCap 100mg 2C 朝夕食後 7日分 皮疹を予防するお薬です 外用 キンダバート 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所(顔) マイザー軟膏 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所(体) ヒルドイドソフト軟膏 25g 1本 皮膚の乾燥したところ			
副作用		* infusion reaction 軽症・・・投与速度の減速など 重度・・・投与を直ちに中止し、症状に応じた処置を行なう * 皮膚症状・・・保湿剤、ステロイド軟膏、ミノマイシンなど 減量・休薬など (上記の減量の及び中止基準投与間隔の変更規定) * 間質性肺炎 * 低マグネシウム血症・電解質異常 * 心毒性 * 下痢 * 眼障害(角膜炎等)			

レジメン名 (略号)					
アービタックス (250mg) +CF					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	アービタックス	初回 400mg/m ²	DIV	2時間	day 1,8,15
		2回目以降250mg/m ²	DIV	1時間	
2	シスプラチン	100mg/m ²	DIV	2時間	day 1
3	5-FU	1000mg/m ²	DIV	24時間	day 1~4
4					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		21日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		DAY1			
		1) ラクテック 500mL	1本	DIV	6:30~8:00
		2) ソルテム3A 500mL	1本		
		硫酸Mg補正液20mEq	8mL	DIV	8:00~9:30
3) ソルテム3A 500mL	1本				
ポラミン5mg	1A	DIV	9:30~11:00		
4) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1袋				
プロイメンド150mg	1V				
デキサート 6.6mg	2V				
プリンペラン 10mg	1A	DIV	11:00~11:30		
5) アービタックス	250mg/m ²		(DAY1,8,15)		
生食	250mL	DIV	11:30~12:30		
6) マンニトールS	1本	DIV	12:30~13:30		
7) シスプラチン	100mg/m ²				
生食	250mL	DIV	13:30~15:30		
8) 5-FU	1000mg/m ²		(DAY1~4)		
生食	500mL	DIV	15:30~15:00		
9) ラクテック 500mL	1本	DIV	15:30~17:00		
10) ソルテム3A 500mL	1本	DIV	17:00~18:30		
		DAY2~3			
		1) デキサート 6.6mg	1V		
		プリンペラン10mg	1A		
		生食 100mL	1本	DIV	12:00~12:30
2) ラクテック 500mL	1本	DIV	12:30~14:00		
3) ソルテム3A 500mL	1本	DIV	14:00~15:30		
		DAY 8,15			
		1) ポラミン5mg	1A		
		デキサート6.6mg	1V		
		生食	50mL	DIV	7:00で
2) アービタックス	250mg/m ²				
生食	250mL	DIV	60分で		
3) 生食	50mL	DIV			
副作用	*infusion reaction 軽症…投与速度の減速など 重度…投与を直ちに中止し、症状に応じた処置を行なう *皮膚症状…保湿剤、ステロイド軟膏、ミノマイシンなど 減量・休薬など (上記の減量の及び中止基準投与間隔の変更規定) *間質性肺炎 *低マグネシウム血症・電解質異常 *心毒性 *下痢 *眼障害(角膜炎等) 骨髄抑制 : 頻回の血液検査 WBC↓↓、好中球↓↓に対しG-CSF使用 悪心、嘔吐 : 制吐剤 腎機能障害 : 輸液負荷、適宜、利尿剤使用				

レジメン名 (略号)					
アービタックス単剤					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	アービタックス(セキキマブ)	500mg/m ²	DIV	2時間	day 1
2					
3					
4					
1コース期間 (次コースまでの期間)		14日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) ポララミン(5mg) 1 A デキサート(8.8mg) 1 A 生食(50mL) 1本 DIV 2) アービタックス 500mg/m ² 生食(250mL) 1本 2時間でDIV 3) 生食(50mL) 1本 フラッシュ 内服 ミノマイシンCap 100mg 2C 朝夕食後 7日分 皮疹を予防するお薬です 外用 キンダバート 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所 (顔) マイザー軟膏 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所 (体) ヒルドイドソフト軟膏50g 1本 皮膚の乾燥したところ			
副作用		* infusion reaction 軽症…投与速度の減速など 重度…投与を直ちに中止し、症状に応じた処置を行なう * 皮膚症状…保湿剤、ステロイド軟膏、ミノマイシンなど 減量・休薬など (上記の減量の及び中止基準投与間隔の変更規定) * 間質性肺炎 * 低マグネシウム血症・電解質異常 * 心毒性 * 下痢 * 眼障害(角膜炎等)			

レジメン名(略号)					
アービタックス(毎週)+PTX					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	アービタックス(セキキマブ)	初回 400mg/m ²	DIV	2時間	day 1. 8. 15. 22
		2回目以降250mg/m ²	DIV	1時間	
2	パクリタキセル	80mg/m ²	DIV	1時間	day 1. 8. 15. 22
3					
4					
1コース期間(次コースまでの期間)		28日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) ポララミン(5mg) 1A デキサート(6.6mg) 1A 生食(50mL) 1本 DIV 2) アービタックス 250(400)mg/m ² 生食(250mL) 1本 1時間(2時間)でDIV 3) ファモチジン(20mg) 1A デキサート(6.6mg) 0.5V 生食(50mL) 1本 DIV 4) 生食(100mL) 1本 30分でDIV 5) パクリタキセル 80mg/m ² 5%ブドウ糖(250mL) 1本 DIV 6) 生食(50mL) 1本 内服 ミノマイシンCap 100mg 2C 朝夕食後 7日分 皮疹を予防するお薬です 外用 キンダベート 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所(顔) マイザー軟膏 5g 1本 1日2回 皮疹の出た所(体) ヒルドイドソフト軟膏 25g 1本 皮膚の乾燥したところ			
副作用		* infusion reaction 軽症…投与速度の減速など 重度…投与を直ちに中止し、症状に応じた処置を行なう * 皮膚症状…保湿剤、ステロイド軟膏、ミノマイシンなど 減量・休薬など (上記の減量の及び中止基準投与間隔の変更規定) * 間質性肺炎 * 低マグネシウム血症・電解質異常 * 心毒性 * 下痢 * 眼障害(角膜炎等)			

レジメン名(略号)					
オブジーボ					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	オブジーボ	240mg/Body	DIV	30分	day1(14日毎)
2	または	480mg/Body	DIV	30分	day1(28日毎)
3					
4					
5					
1コース期間(次コースまでの期間)休薬の規定		240mg14日毎または、480mg28日毎	総コース数	PDまで	
1日の投与スケジュール 処方例		フィルター付輸液セットを使用する 1) ポラミン(5mg) 1A 生食(50mL) 1本 10分でDIV 2) 生食(50mL) 1本 フリー 3) オブジーボ 240mg/Body(480mg/Body) 生食(100mL) 1本 1時間でDIV 4) 生食(50mL) 1本 フラッシュ			
副作用		間質性肺炎 重症筋無力症、筋炎 大腸炎、重度の下痢 1型糖尿病 肝機能障害、肝炎 甲状腺機能障害 神経障害 腎障害 副腎障害 脳炎 …… 痙攣発作、重積にはフェニトイン、ジフェヒパム、脳浮腫に対してはグリセロール、ステロイド 重度の皮膚障害 …… 血漿交換法や免疫グロブリン大量投与が必要になる場合もある。 静脈血栓塞栓症 …… 抗凝固療法、血栓溶解療法、血管内治療法、手術療法等を検討する。 Infusion reaction …… 注入速度を緩めるか中止。症状に応じて薬剤投与。 ぶどう膜炎 …… 本剤の投与を中止し、眼科への受診を勧める。 血小板減少、貧血			
		必要に応じ、専門医と連携して、本剤の中止など適切な処置を行 必要に応じ、ステロイドや免疫抑制剤を投与する。			

レジメン名 (略号)					
カルボプラチン+パクリタキセル【3週間毎】					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パクリタキセル	200mg/m ²	DIV	3時間	day 1
2	カルボプラチン	AUC=6	DIV	1時間	day 1
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		21日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイド レーション)		<p>DAY1</p> <p>1) テキサート 6.6mg 3V ファモチジン20mg 1A 生食 (50mL) 1本 DIV</p> <p>2) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg 1袋 プロイメンド150mg 1V DIV 30分</p> <p>3) パクリタキセル 200mg/m² 5%ブドウ糖 (500mL) 1本 DIV 3時間</p> <p>4) カルボプラチン AUC=6 生食 (250mL) 1本 DIV 1時間</p> <p>5) 生食 (50mL) 1本 フラッシュ</p> <p>内服 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 分1 1日分 パクリタキセル投与30分前に</p> <p>DAY2より内服</p> <p>内服 デカドロン錠4mg 2錠 ファモチジンOD錠10mg 2錠 分2 3日分</p>			
副作用		<p>好中球減少 …… 減量、休薬、必要に応じ、G-CSFの投与</p> <p>血小板減少 …… 減量、休薬、必要に応じ、血小板輸血</p> <p>悪心・嘔吐 …… 制吐剤の投与</p> <p>しびれ …… 休薬、減量、薬剤投与 (リリカ、サインバルタ、モービック、牛車腎気丸、メチコパールな)</p> <p>筋肉痛 …… モービック錠、芍薬甘草湯</p> <p>口内炎</p> <p>脱毛</p>			