

腎機能に注意が必要な薬剤⑥ ブルーレター(安全性速報)

こんにちは！『MiYAGOSTINI（ミヤゴスティーニ）』第6弾です！

気付けば春が近づいていますね。今回のテーマはブルーレター発出等の医薬品です。ブルーレターなどを改めておさらいしてみませんか？腎機能を確認する最初の一步として、MiYAGOSTINIをぜひご活用ください！

		CKDシール黄色				CKDシール赤色									
		GFRまたはCCr (mL/min)								透析					
		60		50		40		30		20		10			
ブルーレーター	プラザキサカプセル (ダビガトラン)	1回150 mg 1日2回 経口P-gp 阻害薬(※1)併用患者、70歳以上の患者、消化管出血 の既往患者では、1回110 mg を1日2回を考慮				1回110 mg を1日2回 経口P-gp 阻害薬(※1) 併用患者は投与回避 (AUCは健康者の3.2倍に増加)				禁忌(血中濃度上昇、出血の危険性増大) (AUC は健康者の6.3倍に増加)					
	ランマーク皮下注 (デノスマブ)	①多発性骨髄腫・固形癌骨転移による骨病変: 1回120 mg 4週間に1回 皮下注 ②骨巨細胞腫: 1回120 mg を第1, 8, 15, 29日 その後 4週間に1回 皮下注				腎機能正常者と同じ				慎重投与(低カルシウム血症を起こす恐れあり)					
医療安全情報	リウマトレックス カプセル (メトトレキサート)	①関節リウマチ: 6 ~ 8 mg/週で開始 増量は週2 mg ずつ 最大 16 mg/週まで漸増可 1週間あたりの投与量を1 回または2 ~ 3回に分割し 12 時間間隔で1 ~ 2日間かけて投与(※2) ②尋常性乾癬,関節症性乾癬, 膿疱性乾癬, 乾癬性 紅皮症, 若年性特発性関節炎: 添付文書参照				①薬薬を併用し, 1週間2 ~ 4 mgで開始 慎重に漸増				禁忌					
重大な死亡例	サンリズムカプセル (ビルシカイニド)	1日150 mg 分3 1日225 mg まで増量可				1日1回50 mg				1日1回25 mg		1回25 mg 48時間毎		1日25 mg から開始(添) 1回25 mg を48時間毎	