

食道癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
E55	シスプラチン(d1)+5-FU(d1-5)	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	80mg/m ²	Day 1	28日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	800mg/m ²	Day1~5	
E6	FP+RT療法(Stage I、IVa)	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	70mg/m ²	Day 1	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	700mg/m ²	Day1~5	
E60	FP+RT療法(Stage II、III)	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	75mg/m ²	Day 1	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	1000mg/m ²	Day1~5	
E61	アクブラ【低用量】+5-FU+CRT	ネダプラチン(CDGP)	アクブラ	7mg/m ²	Day1-5,8-12,	42日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	350mg/m ²	15-19,22-26	
E615	オブジーボ単独(2週毎)	ニボルマブ	オブジーボ	240mg/body	Day1	14日
E616	オブジーボ単独(4週毎)	ニボルマブ	オブジーボ	480mg/body	Day1	28日
E64	ドセタキセル【3週毎】	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/m ²	Day1	21日
E65	パクリタキセル【weekly】100mg/m²	パクリタキセル(PTX)	パクリタキセル	100mg/m ²	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	56日
E66	ネダプラチン+5-FU(d1-5)	ネダプラチン(CDGP)	アクブラ	90mg/m ²	DAY1	28日
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	800mg/m ²		

レジメン名 (略号)					
シスプラチン(d1)+5FU(d1-5)					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	シスプラチン	80mg/m ²	DIV	1時間	day 1
2	5-FU	800mg/m ²	DIV	21時間	day 1~5
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		<p>DAY1</p> <p>1) ラクテック 500mL 1本 DIV 8:30~9:30</p> <p>2) ソルデム3A 500mL 1本</p> <p>硫酸Mg補正液20mEq 8mL DIV 9:30~10:30</p> <p>3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 10:30~11:30</p> <p>4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 1袋</p> <p>ホスアプレピタント150mg 1V</p> <p>デキサート 6.6mg 2V</p> <p>プリンペラン 10mg 1A DIV 11:30~12:00</p> <p>5) マンニトールS 1本 DIV 12:00~12:30</p> <p>6) シスプラチン 80mg/m²</p> <p>生食 250mL DIV 12:30~13:30</p> <p>8) ラクテック 500mL 1本 DIV 13:30~14:30</p> <p>9) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 14:30~15:30</p> <p>7) 5-FU 800mg/m²</p> <p>生食 500mL DIV 15:30~12:30</p> <p>DAY2~3</p> <p>1) 生食 50mL 1本 DIV 12:30フラッシュしてルート交換</p> <p>2) ラクテック 500mL 1本 DIV 13:00~14:00</p> <p>3) ソルデム3A 500mL 1本 DIV 14:00~15:00</p> <p>4) デキサート 6.6mg 1V</p> <p>プリンペラン10mg 1A</p> <p>生食 100mL 1本 DIV 15:00~15:30</p> <p>5) 5-FU 800mg/m²</p> <p>生食 500mL DIV 15:30~12:30</p> <p>DAY4~5</p> <p>1) 生食 50mL 1本 DIV フラッシュしてルート交換</p> <p>2) 生食 50mL 1本 DIV フライミング用</p> <p>3) 5-FU 800mg/m²</p> <p>生食 500mL DIV 21時間</p> <p>DAY6</p> <p>1) 生食 50mL 1本 DIV フラッシュ</p>			

レジメン名 (略号)					
FP+RT療法 (Stage I、IVa)					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	シスプラチン	70mg/m ²	DIV	2時間	day 1
2	5-FU	700mg/m ²	DIV	24時間	day 1~4
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		DAY1			
		1) パロノセトロン 0.75mg 1袋 ホスアプレピタント150mg 1V デキサート 6.6mg 2V プリンペラン 10mg 1A 30分でDIV			
		2) マンニトールS 1本 30分でDIV			
		3) ソルデム3A 500mL 1本 硫酸Mg補正液20mEq 8mL 60分でDIV			
		4) シスプラチン 70mg/m ² 生食 250mL 120分でDIV			
		5) ラクテック 500mL 1本 60分でDIV			
		6) ソルデム3A 500mL 1本 60分でDIV			
		7) 5-FU 700mg/m ² 生食 500mL 24時間でDIV (シスプラチン投与後何時からでも投与可)			
		DAY2~4			
		1) デキサート 6.6mg 1V プリンペラン10mg 1A 生食 50mL 1本 DIV (DAY4なし)			
		2) 生食 50mL 1本 DIV フライミング用			
		5) 5-FU 700mg/m ² 生食 500mL 24時間でDIV			
		DAY5			
		1) 生食 50mL 1本 DIV フラッシュ			

レジメン名 (略号)					
FP+RT療法 (Stage II、III)					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	シスプラチン	75mg/m ²	DIV	2時間	day 1
2	5-FU	1000mg/m ²	DIV	24時間	day 1~4
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		DAY1			
		1) パロノセトロン 0.75mg 1袋 ホスアプレピタント150mg 1V デキサート 6.6mg 2V プリンペラン 10mg 1A 30分でDIV			
		2) マンニトールS 1本 30分でDIV 3) ソルデム3A 500mL 1本 硫酸Mg補正液20mEq 8mL 60分でDIV			
		4) シスプラチン 75mg/m ² 生食 250mL 120分で DIV 5) ラクテック 500mL 1本 60分でDIV 6) ソルデム3A 500mL 1本 60分でDIV 7) 5-FU 1000mg/m ² 生食 500mL 24時間でDIV (シスプラチン投与後何時からでも投与可)			
		DAY2~4			
		1) デキサート 6.6mg 1V プリンペラン10mg 1A 生食 50mL 1本 DIV (DAY4なし)			
		2) 生食 50mL 1本 DIV フライミング用 5) 5-FU 700mg/m ² 生食 500mL 24時間で DIV			
		DAY5			
		1) 生食 50mL 1本 DIV フラッシュ			

レジメン名 (略号)					
低用量アクリブラ/5-FU+化学放射線療法(CRT) No.0120					
※浜医よりのレジメン					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	5-FU	350mg/m ²	DIV	23時間	day1~5、day8~12 day15~19、day22~26
2	アクリブラ(ネオプラチ)	7mg/m ²	DIV	90分	
3	放射線照射	1.8~2Gy/day			day1~5、day8~12 day15~19、day22~26 day29~33、day36~40
1コース期間(次コースまでの期間) 休薬の規定		6週間(土日休薬)		総コース数	1コース
1日の投与スケジュール 処方例		DAY1~5、8~12、15~19、22~26			
		1) デキサート(6.6mg) 1V パロノセトロン 1本 パロノセトロンはDAY1のみ 2) アクリブラ(10mg) 7mg/m ² アクリブラはDAY1のみ 生食(100mL) 1本 90分でDIV 3) 5-FU 350mg/m ² 23時間でDIV ラクテック(500mL) 60分でDIV			
		DAY6,13,20,27			
		1) 生食(50mL) 1本 ルートラッシュ			

レジメン名 (略号)					
オブジーボ					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	オブジーボ	240mg/Body	DIV	30分	day 1 (14日毎)
2	または	480mg/Body	DIV	30分	day 1 (28日毎)
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		240mg14日毎または、 480mg28日毎	総コース数	PDまで	
1日の投与スケジュール 処方例		フィルター付輸液セットを使用する 1) ポララミン(5mg) 1 A 生食(50mL) 1本 10分でDIV 2) 生食(50mL) 1本 フリー 3) オブジーボ 240mg/Body(480mg/Body) 生食(100mL) 1本 30分でDIV 4) 生食(50mL) 1本 フラッシュ			

レジメン名 (略号)					
パクリタキセル【Weekly】					
※アルコール過敏患者に注意					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	パクリタキセル※	100mg/m ²	DIV	1時間	day 1, 8, 15, 22, 29, 36
2					
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		49日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		*フィルター付輸液セットを使用 内服薬 レスタミン錠 5錠 1) デキサート(6.6mg) 1 V ファモチジン(20mg) 1本 生食(50mL) 1本 全開でDIV 2) 生食(100mL) 1本 30分でDIV 3) パクリタキセル 100mg/m ² 5%ブドウ糖(250mL) 1本 1時間でDIV 4) 生食(50mL) 1本 フリー			

レジメン名 (略号)					
ネダプラチン+5FU(d1-5)					
	抗癌剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	アクブラ	90mg/m ²	DIV	90分	day 1
2	5-FU	800mg/m ²	DIV	21時間	day 1~5
3					
4					
5					
1コース期間 (次コースまでの期間) 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例 (ショートハイドレーション)		DAY1 1) パロノセトロン 0.75mg 1袋 デキサート 6.6mg 1V DIV 7リ- 2) アクブラ 90mg/m ² 生食 250mL DIV 90分で 3) ラクテック 500mL 1本 DIV 60分で 4) ラクテック 500mL 1本 DIV 60分で ----- 5) 5-FU 800mg/m ² 生食 500mL DIV 21時間で ----- DAY2~5 1) 生食 50mL 1本 DIV フラッシュしてルート交換 2) デキサート 6.6mg 1V 生食 100mL 1本 DIV 7リ- 3) 5-FU 800mg/m ² 生食 500mL DIV 21時間 ----- DAY6 1) 生食 50mL 1本 DIV フラッシュ			