

膵臓癌						
レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
I1	アブラキサン+ゲムシタビン	パクリタキセル(nab-PTX) ゲムシタビン	アブラキサン ゲムシタビン	125mg/m ² 1000mg/m ²	DAY1、8、15 DAY1、8、15	28日
I2	FOLFIRINOX	オキサリプラチン イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(1-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	エルブラット イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
I3	ゲムシタビン【(1)(8)】+S-1【(1-14)】21日	ゲムシタビン S-1	ゲムシタビン エスワン	1000mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1、8 DAY1～14	21日
I4	ゲムシタビン単独【(1)(8)(15)】	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	DAY1、8、15	28日
I5	オニバイド+5-FU+LV	イリノテカン(nal-IRI) レボホリナート(1-LV) フルオロウラシル(5-FU)	オニバイド レボホリナート 5-FU	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1	14日

レジメン名（略号）					
アブラキサン+ゲムシタピン 3週投与+1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	アブラキサン	125mg/m ²	DIV	30分	day 1、8、15
2	ゲムシタピン	1000mg/m ²	DIV	30分	day 1、8、15
3					
4					
5					
1コース期間		28日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート 6.6mg 1V パロノセトロン 1本 DIV 2) アブラキサン 125mg/m ² 生理食塩液 適宜 30分かけてDIV 3) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ 4) ゲムシタピン 1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 5) 生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ (内服) 牛車腎気丸とメチコパール錠を服用する場合があります。			

レジメン名（略号）

FOLFIRINOX

	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	エルプラット(オキサリプラチン)	85mg/m ²	DIV	2時間	day 1
2	カンプト(イリリチン)	180mg/m ²	DIV	90分	day 1
3	レボホリナート	200mg/m ²	DIV	2時間	day 1
4	5-FU	400mg/m ²	DIV	全開	day 1
5	5-FU	2400mg/m ²	DIV	46時間	day 1～3
1コース期間（次コースまでの期間） 休薬の規定		14日間		総コース数	4週毎に評価
1日の投与スケジュール 処方例		1) パロノセトロン(0.75mg) 1 P デキサート(6.6mg) 1 V ポラミン(5mg) 1 A ホスアプレピタント(150mg) 1 V ブスコパン(20mg) 1 A 30分でD I V 2) エルプラット(100mg) 85mg/m² ※ 5%ブドウ糖(250mL) 1本 2時間でD I V 3) カンプト 180mg/m² 5%ブドウ糖(250mL) 1本 4) と同時開始 90分 側管 4) レボホリナート 200mg/m² 5%ブドウ糖(250mL) 1本 2時間でDIV 5) 5-FU 400mg/m² 5%ブドウ糖(50mL) 1本 全開 側管 6) 生食 1本 フラッシュ 7) 5-FU 2400mg/m² 生食 ()mL 46時間 (インフューザーポンプを使用) 7) 生食シリンジ(20mL) 1本 ポートフラッシュ用 Day2より 内服 デカドロン 4mg 2錠 ファモチジン 10mg 2錠 分2 3日分			

レジメン名（略号）					
ゲムシタビン【①⑧】+ S-1【1-14】 21日 2週投与1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1、8
2	S-1	80mg/m ²	PO		day1～14
3					
1コース期間（次コースまでの期間） 休薬の規定		21日間	総コース数		
1日の投与スケジュール 処方例		1) デキサート 6.6mg 生理食塩液 50mL	1V 1本 DIV		
		2) ゲムシタビン 5%ブドウ糖 100mL	1000mg/m ² 1本 30分かけてDIV		
		3) 生理食塩液 50mL	1本 フラッシュ		
		内服 S-1	DAY1～14（7日休薬）		

レジメン名（略号）					
ゲムシタピン単独【①⑧⑮】 3週投与＋1週休薬					
	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	ゲムシタピン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1、8、15
2					
3					
4					
5					
1コース期間（次コースまでの期間） 休薬の規定		28日間		総コース数	
1日の投与スケジュール 処方例		1）デキサート 6.6mg 生理食塩液 50mL 1本 DIV 2）ゲムシタピン 1000mg/㎡ 5%ブドウ糖 100mL 1本 30分かけてDIV 3）生理食塩液 50mL 1本 フラッシュ			

レジメン名（略号）

オニバイド+5-FU+LV

	抗癌剤	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	オニバイド	70mg/m ²	DIV	90分	day 1
2	レボホリナート	200mg/m ²	DIV	2時間	day 1
3	5-FU	24000mg/m ²	DIV	46時間	day 1～3
4					
5					

1コース期間（次コースまでの期間）	14日間	総コース数	
休薬の規定			
1日の投与スケジュール 処方例	1) ブスコパン 1 A デキサート(6.6mg) 1 V パロノセトロン(0.75mg) 1袋 フリーでDIV 2) オニバイド 70mg/m ² 生食(500mL) 1本 90分でD I V 3) 生食(50mL) 1本 4) レボホリナート 200mg/m ² 5%ブドウ糖(250mL) 1本 2時間でDIV 5) 生食(50mL) 1本 6) 5-FU 2400mg/m ² 生食 46時間 （インフューザーポンプを使用） 7) 生食(20mL) 1本 ポートフラッシュ用		